

Glossaire et mots utilisés en relation avec le chevreuil

<i>Aboyer</i>	Cris d'alerte du chevreuil
<i>Abrouissement</i>	Prélèvement des bourgeons et des jeunes pousses par le chevreuil
<i>Abschuss</i>	Terme germanique utilisé pour désigner un animal à éliminer
<i>Andouiller</i>	Pointe des bois du chevreuil
<i>Apogée</i>	Se dit d'un brocard à l'optimum du développement de ses bois
<i>Assassin</i>	Se dit d'un brocard, généralement âgé, dont les bois n'ont pas d'andouillers
<i>Bizarde</i>	Désigne la tête d'un cervidé portant des bois présentant des anomalies
<i>Bois</i>	Production osseuse se développant sur la tête des cervidés mâles
<i>Bosses</i>	Les deux excroissances osseuses sur la tête des chevrillards mâles
<i>Bréhaigne</i>	Chevrette stérile
<i>Brocard</i>	Chevreuril mâle
<i>Broches</i>	Petit bois (2 -3 cm) non ramifié et dépourvu de meules apparaissant sur les pivots du chevrillard mâle en novembre - décembre
<i>Broquard</i>	Autre mot utilisé pour brocard (chevreuil mâle)
<i>Cantonné</i>	Gibier qui ne quitte guère l'endroit où il est né
<i>Cervidés</i>	Famille d'animaux appartenant à l'ordre des Artiodactyles dont fait partie le chevreuil
<i>Chevrette</i>	Chevreuril femelle
<i>Chevrillard</i>	Jeune chevreuil de 6 à 18 mois
<i>Coiffé</i>	Se dit d'un chevreuil qui porte des bois
<i>Cor</i>	Pointe des bois du chevreuil
<i>Couche</i>	Emplacement de repos du chevreuil
<i>Couchette</i>	Emplacement de repos du chevreuil
<i>Coulée</i>	Itinéraire habituel de déplacement des animaux

<i>Couronne</i>	Base des bois du chevreuil
<i>Décoiffé</i>	Se dit d'un chevreuil qui a perdu ses bois
<i>Dépouillement</i>	Désigne l'enlèvement du velours sur les bois
<i>Faire sa tête</i>	Se dit des cervidés auxquels les nouveaux bois repoussent
<i>Faon</i>	Jeune chevreuil jusqu'à 6 mois
<i>Frayer</i>	Action de frotter les bois aux troncs ou aux buissons afin de se débarrasser du velours
<i>Frottis</i>	Marquages du territoire du brocard
<i>Gagnage</i>	lieu où le gibier va se nourrir
<i>Gouttières</i>	Sillons sur la partie principale des bois du chevreuil
<i>Glandes</i>	Glandes odoriférantes de marquage et de communication
<i>Grattis</i>	Endroits où le gibier a arraché de l'herbe (ou de la neige)
<i>Lambeaux</i>	Morceaux de velours qui se détachent des bois lorsqu'ils frayent
<i>Livrée</i>	Robe que porte les faons
<i>Massacre</i>	Ensemble constitué par les bois et une partie de l'os crânien du chevreuil (trophée)
<i>Merrain</i>	Partie principale des bois du chevreuil
<i>Meule</i>	Bourrelet osseux formant la base sur laquelle les bois du chevreuil poussent
<i>Moquette</i>	Excréments du chevreuil
<i>Mue</i>	Perte et repousse des bois du chevreuil
<i>Mue</i>	Le bois perdu
<i>Oestrus</i>	Période où la femelle est féconde
<i>Perlures</i>	Petites saillies ou excroissances sur les bois du chevreuil
<i>Pierrures</i>	Petites saillies ou excroissances sur la couronne des bois du chevreuil
<i>Pinces</i>	Les sabots du chevreuil
<i>Pivot</i>	Bourrelet osseux formant la base sur laquelle les bois du chevreuil poussent
<i>Pointe</i>	Pointes des bois du chevreuil

<i>Raire</i>	Le cri du chevreuil
<i>Ravaler</i>	Se dit quand les bois dégènèrent à cause de l'âge
<i>Refaits</i>	Désigne des bois sous velours en cours de formation
<i>Régalis</i>	Marquages au sol du territoire du brocard
<i>Reposée</i>	Emplacement de repos du chevreuil
<i>Rut</i>	Etat des animaux au moment de la période d'accouplement
<i>Sillons</i>	Rayures sur la partie principale des bois du chevreuil
<i>Tête</i>	Bois des cervidés
<i>Tête ouverte</i>	Tête du chevreuil dont les bois sont bien écartés
<i>Trophée</i>	Ensemble constitué par les bois et une partie de l'os crânien du chevreuil
<i>Velours</i>	Peau recouverte de poils fins, laineux et serrés, sous laquelle se développe les bois des cervidés
<i>Venaison</i>	Non donné à la chair du gibier